




新型冠状病毒 感染的肺炎

防控知识（二）

学校企业篇

成都市双流区疾病预防控制中心 宣

学校及托幼机构 新型冠状病毒感染的肺炎防控工作指南

1.管理要求

1.1建立完善新型冠状病毒感染的肺炎防控体系，落实专人负责，制定防控方案。

1.2及时清理打扫，保持环境卫生整洁。

1.3加强教学及生活环境（如教室、音乐室、舞蹈室、阅览室、保育室、宿舍、教研室）的通风换气。使用集中空调的要保证足够的新风量、加强风管及部件的清洗消毒。

1.4有条件的配备校医,加强对学生情况了解。

1.5配备一定数量的温度计、医用口罩等。

1.6设置充足的洗手水龙头并保证供水设施正常工作，洗手间配备足够的洗手液，有条件的可配备免洗手消毒剂。

2.人员管理

2.1实行健康监测，身体健康方可入校，不带病上班、上课。出现发热、乏力、干咳、腹泻及胸闷等症状，主动戴上口罩到就近的医院发热门诊就医。如果有相关疾病流行地区的旅游史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉医生，



配合医生开展相关调查。

2.2建议师生佩戴口罩，并及时更换。

2.3严格落实因病缺课登记和病因追踪，有师生被诊断为新型冠状病毒感染的肺炎时，其密切接触者应接受14天医学观察。学校和托幼机构由专人负责与离校或离园的学生进行家访联系，了解每日健康状况。按卫生健康部门的要求进行报告，配合做好疫情处置和防控工作。



2.4学生座位间保持足够距离，原则上确保学生间距1米以上。

2.5不举行游园、庆典等活动；不开展班级交叉的集体活动。

2.6分时、分餐进食，减少人员聚集。

3.消毒

3.1课桌椅、办公桌、门把手、扶手等物体表面，用有效氯250-500mg/L（1-2公斤水放1片泡腾片）的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒，作用30分钟后再用清水擦拭或冲洗。对不耐腐蚀的物品，用75%的酒精或0.1%苯扎溴铵（新洁尔灭）擦拭消毒。每天至少1次。

3.2大面积的地面和墙面，用有效氯250-500mg/L（1-2公斤水放1片泡腾片）的含氯消毒剂进行喷雾消毒，喷洒

量以表面湿润且无滴流现象为准，作用时间不少于30分钟。

3.3清洁工具用有效氯500mg/L（1公斤水放1片泡腾片）的含氯消毒剂浸泡30分钟后清洗晾干。

3.4消毒过程中要注意安全，穿长筒水鞋、戴口罩、防水长手套，防止消毒液喷溅到眼、面，漂白衣物，消毒完成后及时清洁双手。

4.垃圾处理

4.1设置废弃口罩专用收集容器引导师生规范投放废弃口罩，用含氯消毒剂喷洒湿润后按生活垃圾进行处理。

4.2及时清理垃圾并对垃圾及垃圾箱进行消毒。

5.宣传教育

开设健康教育课，设置宣传栏，利用电视、LED等，开展新型冠状病毒感染的肺炎相关防控知识宣传，比如防控知识、手卫生、“六步洗手法”等，提升师生的防病意识和能力。



企业工厂 新型冠状病毒感染的肺炎防控工作指南

1.管理要求

1.1建立完善新型冠状病毒感染的肺炎防控体系，落实专人负责，制定防控方案。

1.2及时清理打扫，保持环境卫生整洁。

1.3加强工作环境的通风换气，必要时采取机械通风。使用集中空调的要保证足够的新风量、加强风管及部件的清洗消毒。

1.4配备一定数量的温度计。

1.5尽量减少集中会议，或尽量控制会议时间。

1.6设置充足的洗手水龙头并保证供水设施正常工作，洗手间配备足够的洗手液，有条件的可配备免洗手消毒剂。



2.人员管理

2.1实行健康监测，上岗前监测体温，身体健康方可上班。出现发热、乏力、干咳、腹泻及胸闷等症状，不带病上班，主动戴上口罩到就近的医院发热门诊就医。如果有相关疾病流行地区的旅游史，以及发病后接触过

什么人，应主动告诉医生，配合医生开展相关调查。

2.2多人办公的场所和会议室，工位和座位须保持1米以上的距离；建议工作人员工作时间佩戴口罩、并及时更换（不超过4小时）。

2.3有集体住宿单位要做好通风和环境卫生，不共用生活用品，保持宿舍清洁。

2.4不举办大型活动；集中用餐的单位实行分时、分餐，减少人员聚集。

3.消毒

3.1办公桌椅、操作台面等，用有效氯250-500mg/L（1-2公斤水放1片泡腾片）的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒，作用30分钟后再用清水擦拭或冲洗。对不耐腐蚀的物品，用75%的酒精或0.1%苯扎溴铵（新洁尔灭）擦拭消毒。每天至少1次。

3.2大面积的地面和墙面，用有效氯250-500mg/L（1-



2公斤水放1片泡腾片)的含氯消毒剂进行喷雾消毒,喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准,作用时间不少于30分钟。

3.3清洁工具用有效氯500mg/L(1公斤水放1片泡腾片)的含氯消毒剂浸泡30分钟后清洗晾干。

3.4消毒过程中要注意安全,穿长筒水鞋、戴口罩、防水长手套,防止消毒液喷溅到眼、面,漂白衣物,消毒完成后及时清洁双手。


4.垃圾处理

4.1设置废弃口罩专用收集容器引导员工规范投放废弃口罩,用含氯消毒剂喷洒湿润后按生活垃圾进行处理。

4.2及时清理垃圾并对垃圾及垃圾箱进行消毒。

5.宣传教育

设置宣传栏或利用电视、LED等,开展新型冠状病毒感染的肺炎相关防控知识宣传,比如防控知识、手卫生、“六步洗手法”等,提升员工的防病意识和能力。



通用预防篇

预防新型冠状病毒感染的肺炎生活中要怎么做？

- 1.尽量减少外出活动。不走亲访友、不聚会、不串门。
- 2.外出佩戴口罩。与人交谈时尽量保持1米以上距离。
- 3.保持手卫生。饭前、便后、接触公共物品用品后、外出返回时要立即洗手。
- 4.注意社交礼仪，打喷嚏或咳嗽时，用手肘衣服遮住口鼻；口鼻分泌物用纸巾包好，丢在有盖垃圾箱内。
- 5.若出现可疑症状（发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难等），及时到医院就医。就医时尽量避免坐公共交通，主动告诉医生自己的旅行居住史。
- 6.居家环境保持整洁卫生，勤开窗，经常通风。
- 7.不要接触、购买和食用野生动物；尽量避免前往售卖活体动物（禽类、海产品、野生动物等）的市场。
- 8.设置套有塑料袋并加盖的垃圾桶，用过的纸巾等生活垃圾放置到加盖垃圾桶里，每天清理，清理时扎紧塑料袋口，再按分类投放。







防控传染病 你我共参与